

AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA AGUDA ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO DE MCGUILL (MPQ)

Antonelli I.B.S.¹ Fernandes L.F.R.M.²

¹Discente do mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba-MG, Brasil;

²Docente do mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba-MG, Brasil
e-mail: fernandes.luciane72@gmail.com

INTRODUÇÃO

O MPQ (figura 1) é um instrumento utilizado na análise da qualidade e intensidade da dor [1]. Avalia a dor em quatro dimensões: sensorial (descritores 1 a 10, pontuação 0 a 41), afetivo (descritores 11 a 15, pontuação de 0 a 14), avaliativo (descritores 16, pontuação de 0 a 5) e miscelânea, descritores (17 a 20, pontuação de 0 a 18). O paciente seleciona uma palavra de cada grupo para descrever a sua dor[1,2]. Tem sido muito utilizado para caracterização das dores crônicas e agudas [3]. Desta forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar a dor pós operatória.

treinado. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFTM-MG com o parecer número 2503.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No M1, destaca-se a dimensão da dor avaliativa (15 mulheres, 35,7%, pontuaram a dor em dois, ou seja perturbadora).No M2, a afetiva (16 mulheres, 38,1%, que pontuaram entre 1 e 3: cansativa). Já no M3, Miscelânea, foi pontuada em zero em 17 mulheres,40,5%,ou seja a maioria sem dor. READING,1982 reforça o uso do MPQ na dor aguda. Verificou-se que os descritores mais frequentemente utilizados em sua caracterização pertenciam ao grupo sensorial e neste estudo, no avaliativo. FABRI et al, 2009 em seu trabalho mostrou que a incisão laparoscópica na Endometriose pode aumentar os sintomas de dor.

CONCLUSÃO

Neste estudo, no M1 a dor foi caracterizada como perturbadora, no M2 como cansativa, exaustiva e enjoativa e no M3, sem dor.

AGRADECIMENTOS

“O presente Trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Brasil (CAPES)- Código de financiamento 001”

REFERÊNCIAS

- 1-Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain. 1975 Sep;1(3):277-99.
- 2-Menezes C L C, Maher C G, McAuley J H , et al. The Brazilian-Portuguese versions of the McGill Pain Questionnaire were reproducible, valid, and responsive in patients with musculoskeletal pain.Clin Epidemiol. 2011 Aug; 64(8):903-12.
- 3- Pereira L V, Sousa F A E F, Mensuração e avaliação da dor pós-operatória: uma breve revisão. Ver. Lat Amer. Enf 1998 Julho; 6(3):77-84.
- 4-Reading A E. A Comparison of the McGill pain questionnaire in chronic and acute pain. Pain. 1982 13: 185-192.
- 5- Fabbri E, Villa G, Mabrouk M, et al. McGill Pain Questionnaire: A multi-dimensional verbal scale assessing postoperative changes in pain symptoms associated with severe endometriosis. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2009 August. 35(4):753-

McGill Pain Questionnaire – Português

Nome _____ Data _____ Hora _____
 Analgésico(s) _____ Dose _____ Hora da Adm. _____
 analgésico(s) _____ Dose _____ Hora da Adm. _____
 Intervalo de Administração dos Analgésicos +4 +1 +2 +3
 IAVD: S. Af. Av. M(S). M(AFAV). M(T). PRI (T).
 (1-10) (11-15) (16) (17-19) (20) (17-20) (1-20)

1 Espasmódica	11 Cansativa	Intensidade Atual de Dor (IAD) _____ Comentários: _____	
2 Crescente	12 Enjoativa		
3 Picada	13 Amedrontadora		
4 Aguda	14 Castigante		
5 Beliscante	15 Desgraçada		
6 Fisgada	16 Incômoda		
7 Quente	17 Difusa		
8 Formigamento	18 Aperto		
9 Insensibilidade	19 Fresca		
10 Suave	20 Importunante		
1 Tremor	1 Exaustiva		
2 Pulsátil	2 Exaustiva		
3 Latejante	3 Enjoativa		
4 Martelante	4 Sufocante		
5 Repentina	5 Aterrorizante		
6 Provocada	6 Castigante		
7 Agulhada	7 Debilitante		
8 Perfurante	8 Cruel		
9 Punhalada	9 Perversa		
10 Lancinante	10 Mortal		
11 Cortante	11 Desgraçada		
12 Dilacerante	12 Enlucidecedora		
13 Pressionante	13 Perturbadora		
14 Píngue	14 Intensa		
15 Cáibra	15 Insuportável		
16 Esmagamento	16 Irradiante		
17 Fiagada	17 Penetrante		
18 Puxão	18 Que transpassa		
19 Distensão	19 Dormente		
20 Queimadura	20 Estirante		
1 Cocciceira	1 Fria	Sintomas que Acompanham: náusea, Dor de cabeça, Tontura, Sonolência, Constipação, Diarréia	
2 Ardência	2 Congelante	Sono: Bom, Descontínuo, Insônia	
3 Ferrosa	3 Importunante	Ingestão de alimentos: Boa, Alguma, Pouca, Nenhuma	
4 Insensibilidade	4 Nauseante	Comentários: _____	
5 Sensibilidade	5 Angustiante	Comentários: _____	
6 Que Machuca	6 Desagradável	Atividades: Boa, Alguma, Pouca, Nenhuma	
7 Dolorida	7 Torturante	Comentários: _____	
8 Forte	8 IAD		
9 Suave	9 Sem dor		
10 Tensão	10 Leve		
11 Esfolante	11 Desconfortante		
12 Rompimento	12 Angustiante		
	13 Horrível		
	14 Excruciante		

Figura 1- Questionário MPQ

METODOLOGIA

Estudo descritivo, realizado com 39 mulheres entre 18 e 61 anos, submetidas à cirurgia laparoscópica e internadas em um Hospital Universitário. A avaliação da dor foi realizada no pós-operatório imediato (M1), primeiro dia de pós operatório (M2) e antes da alta hospitalar no dia seguinte à cirurgia (M3), por meio do MPQ, aplicado por um avaliador previamente

