

## AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES DE ACORDO COM RDC/ DTM

*V. N. Brandão Lima, F. A. Andrade, M. M. S. Santana, J. P. Farias Neto*

**Introdução:** A disfunção temporomandibular (DTM) é uma disfunção multifatorial que engloba distúrbios que envolvem articulação temporomandibular, os músculos mastigatórios e as estruturas próximas. O diagnóstico correto é um problema atravessado por indivíduos com DTM, pois quanto mais tempo a dor persistir, maior o potencial de surgimento e amplificação de fatores de risco cognitivos, psicossociais e comportamentais. **Objetivo:** Avaliar e classificar o tipo de disfunção temporomandibular do paciente. **Metodologia:** O RDC/DTM foi utilizado para o diagnóstico da DTM em pesquisas clínicas por abranger no modelo biopsicossocial, também foi avaliada a medida da amplitude de movimento (ADM) da coluna cervical através da fleximetria e feita a avaliação da incapacidade e da presença de dor na coluna cervical com o questionário Neck Disability Index (NDI), versão adaptada e validada para o português do Brasil. **Resultados:** A prevalência de DTM foi elevada nos grupos dor miofascial com limitação da abertura da boca e artralgia, da mesma maneira houve uma maior quantidade de indivíduos com limitação leve, assim como limitação acentuada da ADM nos movimentos de extensão e rotação da coluna cervical. **Conclusão:** O diagnóstico precoce dessa disfunção é crucial para abrandar a evolução da mesma e se faz necessário intervenções fisioterapêuticas que englobem não só a articulação temporomandibular, mas também na coluna cervical.